



Bruchsal, im August 2013

Die wichtigsten Vogelarten des Raumes Bruchsal / Weingarten und deren Gefährdung durch Windkraftanlagen. Von Friedhelm Weick. Mitarbeiter ab 1970 in der Erfassung der Brutvogelarten (1987 / 88) und Wintervogelarten (Winteratlas) 1991 / 92, dieses Gebietes, sowie Zeichnen aller Illustrationen der Arten und der Habitat-Schemata, für das Standardwerk „Die Vögel Baden-Württembergs“, von Dr. Jochen Hölzinger et al. Diese Mitarbeit besteht bis dato, Erfassungsdaten werden ständig aktualisiert. Geografische Daten für dieses Gebiet: im Westen 8° 30', im Osten 8° 40', im Norden 49° 12', im Süden 49° 00'. Das Zählgebiet erstreckt sich im Westen etwa von Graben-Neudorf, Spöck, Staffort, Weingarten und Grötzingen östlich bis Stettfeld, Ubstadt, Heildelsheim, Helmsheim, Gondelsheim und Wössingen.

Verwendete Abkürzungen:

WKA = Windkraftanlage, BV = Brutvogel, SV = Standvogel, SO = Sommervogel, (Übersommerer), StrV = Strichvogel, ZV = Zugvogel, TZ = Teilzieher, DZ = Durchzügler, WG = Wintergast, (Überwinterer), Z = Zug (oft in großen Höhen), FJ = Flugjagd (auch nach Insekten oder Kreisen), BF = Balzflug, SW = Standortwechsel, s = selten, gG = geringe oder keine Gefährdung durch WKA

Artname	Status	Gefährdung durch WKA bei
Zwergtaucher, <i>Tachybaptus ruficollis</i>	s BV, ZV, oder WG	Z, gG
Haubentaucher, <i>Podiceps cristatus</i>	s BV, DZ, WG	Z, gG
Kormoran, <i>Phalacrocorax carbo</i>	s BV, WG	Z, SW
Zwergdommel, <i>Ixobrychus minutus</i>	s BV, ZV	gG
Graureiher, <i>Ardea cinerea</i>	s BV, SV, DZ, WG	Z, SW
Weißstorch, <i>Ciconia ciconia</i>	BV, DZ, WG	Z, SW,
Graugans, <i>Anser anser</i>	s BV (z.B. Weingartener Moor) ZV, WG	Z, SW
Kanadagans, <i>Branta canadensis</i>	s BV, WG	SW
Stockente, <i>Anas platyrhynchos</i>	BV, SV, WG, ZV	Z, SW
Tafelente, <i>Aythya ferina</i>	s BV z. B. Baggerseen, ZV, TZ, WG	Z, SW
Reiherente, <i>Aythya fuligula</i>	s BV z. B. Baggerseen, ZV, WG, DZ	Z, SW
Rotmilan, <i>Milvus milvus</i>	s BV, s WG,	Z, SW, FJ, BF (oft in großer
Schwarzmilan, <i>Milvus migrans</i>	BV, ZV,	Z, SW, FJ, BF Höhe)
Sperber, <i>Accipiter nisus</i>	BV, SV, WG	SW, FJ
Habicht, <i>Accipiter gentilis</i>	s BV, SV, WG	SW, FJ, BF (oft in großer
Mäusebussard, <i>Buteo buteo</i>	BV, SV,	SW, FJ, BF Höhe)
Wespenbussard, <i>Pernis apivorus</i>	BV, ZV, DZ	Z, SW, BF
Kornweihe, <i>Circus cyaneus</i>	s WG, DZ,	Z, SW, FJ
Turmfalke, <i>Falco tinnunculus</i>	BV, SV, TZ, DZ	SW, FJ
Baumfalke, <i>Falco subbuteo</i>	BV, ZV, DZ	Z, SW, FJ
Wanderfalke, <i>Falco peregrinus</i>	BV westlich des Zählgebietes, SV, WG	SW, FJ, (oft in großer Höhe)
Rebhuhn, <i>Perdix perdix</i>	s BV (Bestand fast erloschen), SV	SW, gG
Wachtel, <i>Coturnix coturnix</i>	s BV, DZ, ZV	Z, SW
Fasan, <i>Phasianus colchicus</i>	BV (eingebürgertes Jagdwild), SV	gG
Teichhuhn, <i>Gallinula chloropus</i>	BV, SV, TZ	gG
Bläßhuhn, <i>Fulica atra</i>	BV, SV, WG	gG
Kiebitz, <i>Vanellus vanellus</i>	s BV, DZ, ZV, WG	Z, SW
Flussuferläufer, <i>Actitis hypoleucos</i>	s SO, DZ, ZV	Z, SW
Lachmöwe, <i>Larus ridibundus</i>	s SO, BV westlich des Zählgebietes, WG	Z, SW
Hohltaube, <i>Columba oenas</i>	BV, ZV, DZ	Z, SW
Ringeltaube, <i>Columba palumbus</i>	BV, TZ, DZ, WG oft in großen Scharen	Z, SW
Türkentaube, <i>Streptopelia decaocto</i>	BV, SV, WG neigt zu Gruppebildung	SW,
Turteltaube, <i>Streptopelia turtur</i>	BV, ZV, DZ	Z, SW
Schleiereule, <i>Tyto alba</i>	BV, SV,	SW, FJ
Steinkauz, <i>Athene noctua</i>	s BV, SV	SW, FJ
Waldkauz, <i>Strix aluco</i>	BV, SV	SW, FJ
Waldohreule, <i>Asio otus</i>	BV, SV	SW, FJ
Ziegenmelker, <i>Caprimulgus europaeus</i>	s BV, ZV,	SW, FJ (oft in großer Höhe)
Mauersegler, <i>Apus apus</i>	BV, ZV, DZ	SW, FJ (oft in großer Höhe)
Kuckuck, <i>Cuculus canorus</i>	BV, ZV, DZ	Z, SW
Sechs Spechtarten: <i>Picus canus, Picus viridis</i>	alle BV, SV	SW, gG
<i>Dryocopus martius, Dendrocopos major, Dendrocopos medius, Dryobates minor</i>		SW, gG
Wendehals, <i>Jynx torquilla</i>	BV, ZV, DZ	Z, SW
Feldlerche, <i>Alauda arborea</i>	BV, ZV, DZ, WG	Z, SW, BF
Uferschwalbe, <i>Riparia riparia</i>	BV; ZV, DZ	Z, SW,
Rauchschwalbe, <i>Hirundo rustica</i>	BV, ZV, DZ	Z, SW, JF (oft in großer Höhe)
Mehlschwalbe, <i>Chelidon urbicum</i>	BV, ZV, DZ	Z, SW, JF (oft in großer Höhe)

Baumpieper, <i>Anthus trivialis</i>	s BV, ZV,	Z (oft in großer Höhe)
Schafstelze, <i>Motacilla flava</i>	s BV, ZV	Z, SW (oft in großer Höhe)
Bachstelze, <i>Motacilla alba</i>	BV, ZV, DZ, WG	Z, SW (oft in großer Höhe)
Seidenschwanz, <i>Bombus garrulus</i>	WG, DZ	Z
Zaunkönig, <i>Troglodytes troglodytes</i>	BV, SV, TZ	gG
Heckenbraunelle, <i>Prunella modularis</i>	BV, ZV, TZ, DZ	Z
Rotkehlchen, <i>Erithacus rubecula</i>	BV, SV, TZ, DZ	Z
Nachtigall, <i>Luscinia megarhynchos</i>	BV, ZV	Z
Blaukehlchen, <i>Luscinia svecice</i>	s BV, ZV	Z
Hausrotschwanz, <i>Phoenicurus ochruros</i>	BV, ZV, TZ	Z
Gartenrotschwanz, <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	BV, ZV,	Z
Braunkehlchen, <i>Saxicola rubetra</i>	BV, ZV	Z
Steinschmätzer, <i>Oenanthe oenanthe</i>	s BV, ZV	Z
Amsel, <i>Turdus merula</i>	BV, SV, TZ	g G
Wacholderdrossel, <i>Turdus pilaris</i>	BV, SV, TZ, DZ	Z, SW, (manchmal in Scharen)
Singdrossel, <i>Turdus philomelos</i>	BV, ZV, DZ	Z
Misteldrossel, <i>Turdus viscivorus</i>	BV, SV, TZ, DZ	Z
Alle Schwirle & Rohrsänger des Gebietes <i>Locustella naevia</i> , <i>Acrocephalus scirpaceus</i> , <i>A. palustris</i> , <i>A. arundinaceus</i> sind		
	s BV, ZV	Z
	s BV, ZV	Z
Gelbspötter, <i>Hippolais icterina</i>	BV, ZV, DZ	Z
Alle vier Grasmückenarten des Gebietes	BV, ZV, DZ	Z
Zilpzalp, <i>Phylloscopus collybita</i>	BV, ZV, DZ	Z
Fitis, <i>Phylloscopus trochilus</i>	BV, ZV, DZ	Z
Waldlaubsänger, <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	BV, ZV, DZ	Z
Wintergoldhähnchen, <i>Regulus regulus</i>	BV, SV, TZ, DZ	Z
Sommeregoldhähnchen, <i>Regulus ignicapillus</i>	BV, ZV, DZ	Z
Grauschnäpper, <i>Muscicapa striata</i>	BV, ZV	Z
Trauerschnäpper, <i>Ficedula hypoleuca</i>	BV, ZV	Z
Die fünf Meisenarten des Gebietes <i>Parus palustris</i> , <i>P. montanus</i> , <i>P. cristatus</i> , <i>P. ater</i> , <i>P. caeruleus</i> & <i>P. majors</i> sind		
	BV, SV,	gG
Schwanzmeise, <i>Aegithalos caudatus</i>	BV, SV, WG	Z, SW
Kleiber, <i>Sitta europaea</i>	BV, SV, TZ, DZ	Z
Die beiden Baumläuferarten des Gebietes <i>Certhia familiaris</i> & <i>C. brachydactyla</i> sind		
	BV, ZV, TZ	Z
Pirol, <i>Oriolus oriolus</i>	s BV, ZV	Z
Neuntöter, <i>Lanius collurio</i>	BV, ZV	Z
Raubwürger, <i>Lanius excubitor</i>	s WG	gG
Eichelhäher, Elster & Rabenkrähe <i>Garrulus glandarius</i> , <i>Pica pica</i> & <i>Corvus corone</i> sind		
	BV, SV, (winters z.T. in Trupps)	SW, gG
	BV, SV, WG (winters in Scharen)	SW
Saatkrähe, <i>Corvus frugilegus</i>	s BV, SV, DZ (winters mit Saatkrähen)	SW
Dohle, <i>Coleus monedula</i>	BV, SV, DZ, WG (oft in Riesenscharen)	SW (Flug zu den Schlafplätzen)
Star, <i>Sturnus vulgaris</i>	BV, SV	gG
Haussperling, <i>Passer domesticus</i>	BV, SV, TZ, DZ	Z
Feldsperling, <i>Passer montanus</i>	BV, SV, TZ, DZ	Z
Buchfink, <i>Fringilla coelebs</i>	WG, DZ (winters oft in Riesenscharen)	Z, SW
Bergfink, <i>Fringilla montifringilla</i>	BV, ZV, DZ	Z, SW
Girlitz, <i>Serinus serinus</i>	BV, SV, TZ, DZ	Z
Grünfink, <i>Carduelis chloris</i>	BV, ZV, WG	Z, SW
Stieglitz, <i>Carduelis carduelis</i>	sBV, ZV, DZ	Z, SW
Erlenzeisig, <i>Carduelis spinus</i>	s SO, ZV, DZ (gelegentlich Invasionen)	Z, SW
Birkenzeisig, <i>Carduelis flammea</i>	BV, ZV, DZ	Z, SW
Bluthänfling, <i>Carduelis cannabina</i>	DZ, (gelegentl. invasionsartige Einflüge)	Z, SW
Fichtenkreuzschnabel, <i>Loxia curvirostra</i>	BV, SV, TZ, DZ	Z, gG
Dompfaff, <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	BV, SV, TZ, DZ	Z, gG
Kernbeißer, <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	BV, SV, TZ, DZ	Z
Goldammer, <i>Emberiza citrinella</i>	BV, ZV, TZ, DZ	Z
Rohrhammer, <i>Emberiza schoeniclus</i>	BV, ZV, TZ, DZ	Z

Diese Arbeit wurde von Friedhelm Weick, Ornithologe, Naturmaler und parteilos, ohne Honorarforderung erstellt.

Für das Erstellen dieser Arbeit benutzte Fachliteratur:

J. Hölzinger et al, 1987-2010: Die Vögel Baden-Württembergs (Avifauna), Band 1 – 5.

F. Weick, 1970 – 2011: Private Aufzeichnungen

Weitere Arbeiten von Weick: F. Weick, 1980: Die Greifvögel der Welt. Verlag P. Parey

U. Mahler & F. Weick, 1994: Der Weißstorch. Verlag SMNKA

M. Braun & F. Weick, 1994: Fledermäuse brauchen Freunde. Verlag SMNKA

O. Kröher & F. Weick, 2004: Anmut im Federkleid (Heimische Vögel). Verlag Gollenstein

F. Weick, 2006: Owls, Strigiformes, Kommentierte Artenliste. Verlag Springer, Heidelberg

C. König & F. Weick, 2006: Owls of the World. Monographie. Verlag Pica Press, London

F. Weick, 2013: Faszinierende Welt der Eulen. Verlag Neumann-Neudamm, Melsungen